

Koncepcja całościowa - chów trzody chlewnej



Żywnienie

Witalizacja

- Witalizacja od samego początku
- Uprawa roślin pastewnych zgodnie z planami witalności PLOCHER



Woda

Efekt wody źródlanej

- Witalizacja wody
- Czyszczenie i ochrona rurociągów
- Stabilizacja twardości wody
- Najłatwiejszy montaż i nieprzerwana skuteczność, bez konieczności konserwacji



Ściółka

Łatwe utrzymanie naturalnej higieny w chlewie

- Proces kompostowania rozpoczyna się już w chlewie
- Dobry klimat w chlewie i mikroklimat w legowiskach
- Higienizacja i wyraźny spadek liczby much
- Wiązanie amoniaku podnosi wartość nawozową
- Redukcja objętości – rzadsze usuwanie obornika



Gnojowica/gnojówka

W taki sposób z gnojowicy/gnojówki uzyskują Państwo pełnowartościowy nawóz wieloskładnikowy

- Homogenizacja obniża koszty energii
- Higienizacja, redukcja zapachu i ilości much
- Rozkład (aerobowy) zapobiega powstawaniu czynników chorobotwórczych, np. salmonelli
- Nawóz dolistny i powstawanie próchnicy
- Przefermentowana gnojowica = ochrona gleby / roślin / wody i klimatu




Chlew

Zapewnienie optymalnego klimatu w chlewie

- Produkty czyszczą i utrzymują pożądaną biologię procesu rozkładu
- Są bezpieczne dla środowiska
- Ulegają naturalnemu rozkładowi


Użytkownicy systemu PLOCHER potwierdzają:

Koncepcja całościowa
przekonuje mnie!



Państwo Keller, F-Balgau

Opłacalna w chlewie i
na polu uprawnym



Państwo Franz, Muldingen

Porównanie
Jakość mięsa



Dodatki do pasz

Od pierwszego dnia: **plocher świnie-specjalne do/na** lub **plocher świnie-tucz do/na**: 50 g/t suchej paszy, 30 g/m³ płynnej paszy, **dodatkowo** wspomagająco przy odsadzaniu: **plocher prosięta-odasadzane do** 0,5 g/prosię/dzień przez tydzień przed i po odsadzeniu,

Informacje podane na naturalnych produktach witalizujących:

plocher witalne-zwierzęta do/na

Locha matka: 5g/dzień 2-3 przed porodem, po porodzie przynajmniej 1 g dziennie przez 3 dni – w razie potrzeby można dodawać do karmy dłużej.

Prosięta: na miot (ok. 10 prosiąt) 3 g raz w tygodniu do odstawienia, lub w razie potrzeby także codziennie.

Tuczniki: faza przyzwyczajania przez 3 dni: 1 g na każdą świnie, dalsze dozowanie przez 2 – 3 tygodnie 30 g/tonę paszy.

Woda

Plocherkat instaluje się bezpośrednio na wodociągu

plocherkat zależnie od jakości wody wystarczający przy dobowym zużycia wody wynoszącym 1 – 1,5 m³, odpowiada to ok. 20 – 25 DJP.

plocher reaktor do stosowania przy większym zużyciu wody od ok. 100 DJP, zależnie od jakości wody.

Postępowanie ze ściółką

Plocherkat instaluje się bezpośrednio na wodociągu

Pierwsze użycie: 3 g/m² bezpośrednio na podłogę.

Kolejne użycia: 2 g/m² tygodniowo lub 5 g/DJP tygodniowo.

2 kg produktu **plocher kompost & obornik** należy zmieszać z 200 litrami wody, np. na 1000 m² powierzchni chlewu.

Gnojowica

Produkty z gnojowicy dostępne w postaci sproszkowanej lub płynnej

plocher gnojowica-świnie cc/me: na 100 m³ gnojowicy w 150 litrach wody

roz mieszać 1,5 kg produktu i dodać-wmieszać do części płynnej gnojowicy (tych 100 m³)

Dalsze regularne stosowanie w chlewie: 5 g/DJP/tydzień

Czyszczenie obory

Naturalny środek czyszczący o jakości środka spożywczego

plocher uniwersalny środek czyszczący po gruntownym sprzątaniu:

spryskać podłogę / ściany / strop roztworem 10 g/100 m² lub 1 g na 10 litrów; do intensywnego czyszczenia: 1g/litr wody.

plocher gnojowica-świnie lub **plocher kompost & obornik**: strop / ściany np. po gruntownym sprzątaniu: pierwsze użycie: 2 g/m², kolejne użycia: 1 g/m²

Przykład kalkulacji dla gospodarstwa prowadzącego tucz świń:

plocher świnie-tucz do 40 g/rok	€ 0,97
plocher witalne-zwierzęta 7,85 g/rok	€ 0,32
plocher gnojowica-świnie cc 40 g/rok	€ 0,86
- lub	
plocher kompost & obornik 40 g/rok	€ 0,86
plocherkat (amortyzacja 10 lat)	€ 0,06
Koszty eksploatacyjne ok.	€ 2,21
rocznie/stanowisko do tuczu/ plus VAT (duży pojemnik)	

Przykładowy rezultat: Badania porównawcze przeprowadzone przez "Amrein Futtermühle"

Protokół:

1 grupa z paszami samodzielnymi PLOCHER (50 g/tonę paszy)

1 grupa z konwencjonalnymi antybiotykami (Carbadox, Salimonicyn, Tylosin)

Parametry	Grupa konwencjonalna	Grupa PLOCHER
Średni przyrost masy	747 g	828 g
Wskaźnik paszowy	2,50	2,38
Średnia masa końcowa tuczników	102,0	109,7